

# Úvod do matematické analýzy

## Výroková logika

### Definice:

**Logika:** věda o správnosti výroků.

**Výrok:** tvrzení, o kterém má smysl říci, zda je pravdivé nebo ne. Obvykle ve formě “premise  $\Rightarrow$  důsledek”. Tarskiho definice: “Výrok  $A$  je pravdivý, jestliže  $A$ .”

### Příklad:

$$(A \Rightarrow B) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A) \\ \iff \neg(A \wedge \neg B)$$

**Výroková funkce:** výraz, z něž obdržíme výrok po dosazení prvků za proměnné. Zapisujeme  $V(x_1, \dots, x_n)$ ,  $x_n \in M_n$ .

**Kvantifikátory:** všeobecný ( $\forall$ ) a existenční ( $\exists$ ). Platí **princip stejnoměrnosti:**

$$\forall x \exists y : V(x, y) \iff \exists y \forall x : V(x, y)$$

## Základní metody důkazů

Používáme zejména důkazy sporem, indukci, přímo a nepřímo. Je záhodno se vyhnout důkazu kruhem.

Při dokazování je vhodné si uvědomit formální definici dokazovaného výroku a aplikovat ji na náš konkrétní případ (např. dokazujeme-li existenci limity, může pomoci vyjít z dosazení do její definice).

**Tvrzení:** Pro  $\forall n \in \mathbb{N} : n^2$  liché  $\Rightarrow n$  liché. **Důkazy:**

### (i) Přímo:

$$n^2 = p_1^2 \cdots p_k^2 \text{ (prvočíselný rozklad)}$$

$$n = p_1 \cdots p_k$$

$$j = 1, \dots, k : p_j \neq 2 \Rightarrow n \text{ liché}$$

### (ii) Nepřímo:

$$n \text{ sudé} \Rightarrow n = 2m \Rightarrow n^2 = 4m^2 \Rightarrow n^2 \text{ sudé}$$

### (iii) Sporem:

$$n^2 \text{ liché} \wedge n \text{ sudé}$$

$$\implies n^2 + n \text{ liché} \implies n(n+1) \text{ liché}$$

$\nexists$  Spor

### (iv) Indukcí:

$n = 1$ :  $1^2$  liché,  $1$  liché.

$n \Rightarrow n + 2$ :  $n^2$  liché  $\Rightarrow (n + 2)^2$  liché (neboť  $(n + 2)^2 = n^2 + 2n + 4 = 2n + 5$  je liché).

*Q.E.D.*

**Další příklady:**

- **Přímo:**  $A \Rightarrow C_1 \Rightarrow C_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow C_n \Rightarrow B$   
**Cauchyho nerovnost:**

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

$$\forall m \in \mathbb{N}, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$$

- (1)  $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ , tedy platí.
- (2)  $\exists i \in \{1, \dots, n\} : a_i \neq 0$ .

**Trik:** Definujme si:

$$f(x) := \sum_{i=1}^n (a_i x + b_i)^2$$

Pak platí:

$$f(x) = \left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) x^2 + \left( \sum_{i=1}^n 2a_i b_i \right) x + \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

$$\alpha > 0, f(x) > 0 \stackrel{\text{z grafu}}{\implies} D \leq 0 \Leftrightarrow \beta^2 - 4\alpha\gamma \leq 0$$

$$\beta^2 - 4\alpha\gamma \leq 0 \implies \beta^2 \leq 4\alpha\gamma = 4 \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq 4 \left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

*Q.E.D.*

- **Sporem:** Předpokládáme opak a dokážeme jeho neplatnost.  
**Iracionalita  $\sqrt{2}$ :**

$$x > 0 : x^2 = 2 \Rightarrow x \notin \mathbb{Q}$$

Nechť  $x = p/q$ , kde  $p, q$  jsou nesoudělná:

$$x^2 = 2 \implies p^2/q^2 = 2 \implies p^2 = 2q^2$$

$$p^2 = 4m \implies q^2 = 2m$$

To je ale spor s nesoudělností  $p, q$ .

*Q.E.D.*

- **Indukcí:** Dokazujeme, že pro  $\forall n \in \mathbb{N} : V(n)$ . Stačí dokázat:

- (i)  $V(1)$
- (ii)  $V(n) \Rightarrow V(n+1)$

**Bernoulliho nerovnost:**

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \forall n \in \mathbb{N}, x \geq -1$$

- (1)  $n = 1$ :  
 $1+x \geq 1+x$

(2)  $V(n) \Rightarrow V(n+1)$ :

$$(1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$$

*Q.E.D.*

**A-G nerovnost:**

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_1, a_2, \dots, a_n > 0$$

$V(1)$  je triviální.

$V(2)$ :  $(a_1 + a_2)/2 \geq \sqrt{a_1 a_2}$ . Nechť  $a = A^2$  a  $b = B^2$ :

$$(A - B)^2 = A^2 + B^2 - 2AB \geq 0$$

$V(n) \Rightarrow V(2n)$ :

$$\frac{a_1 + \dots + a_n + a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{2n} =$$

$$= \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} + \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n} \geq$$

$$\stackrel{V(2)}{\geq} \sqrt[2]{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \cdot \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n}} \geq$$

$$\stackrel{V(n)}{\geq} \sqrt[2]{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \cdot \sqrt[n]{a_{n+1} \dots a_{2n}}} =$$

$$= \sqrt[2n]{a_1 \dots a_{2n}} \Rightarrow V(2n)$$

$V(n+1) \Rightarrow V(n)$ : Mějme  $a_1, \dots, a_n$ .

**Trik:** Definujme:

$$b_1 := \frac{a_1}{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}}$$

$$b_2 := \frac{a_2}{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}}$$

$$b_n := \frac{a_n}{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}}$$

$$b_{n+1} := 1$$

$$V(n+1) \Rightarrow \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_{n+1}}{n+1} \geq \sqrt[n+1]{b_1 b_2 \dots b_{n+1}} = 1$$

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{n+1} \geq n+1$$

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}} \geq n$$

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \Rightarrow V(n)$$

*Q.E.D.*

## Množina reálných čísel

### Definice:

Množina  $A$  je **induktivní**, jestliže:

- (i)  $1 \in A$
- (ii)  $k \in A \Rightarrow k + 1 \in A$

$\mathbb{N} \stackrel{\text{def}}{=} \text{průnik všech induktivních množin (nebo také } \{1, 2, 3, 4, \dots\} \text{)}$ .

$\mathbb{Z} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{N} \cup \{0\} \cup (-\mathbb{N})$

$\mathbb{Q} \stackrel{\text{def}}{=} \{p/q : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$

$\mathbb{R}$  za okamžik.

$\mathbb{C}$  se zabývat nebudeme.

### VĚTA 1 (o reálném tělese):

Existuje právě jedno uspořádané těleso  $\mathbb{R}$ , na němž jsou dány operace “+” a “.”, prvky “0” a “1” a binární relace “ $\geq$ ” s následujícími vlastnostmi:

#### I. Algebraické vlastnosti tělesa:

- (i)  $(x + y) + z = x + (y + z)$  (asociativita)  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- (ii)  $x + y = y + x$  (komutativita)  $\forall x, y \in \mathbb{R}$
- (iii)  $x + 0 = 0 + x = x$   $\forall x \in \mathbb{R}$
- (iv)  $x + (-x) = 0$   $\forall x \in \mathbb{R} : \exists -x \in \mathbb{R}$
- (v)  $(xy)z = x(yz)$   $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- (vi)  $xy = yx$   $\forall x, y \in \mathbb{R}$
- (vii)  $1x = x1 = x$   $\forall x \in \mathbb{R}$
- (viii)  $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$   $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \exists x^{-1} \in \mathbb{R}$
- (ix)  $x(y + z) = xy + xz$   $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$

#### II. Axiomy uspořádání:

- (i)  $x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$  (slabá antisymetrie)  $\forall x, y \in \mathbb{R}$
- (ii)  $x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$  (tranzitivita)  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- (iii)  $x \leq y \vee y \leq x$  (dichotomie)  $\forall x, y \in \mathbb{R}$
- (iv)  $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$   $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- (v)  $xy \geq 0$   $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \geq 0, y \geq 0$

### Axiom o supremu

Nechť  $M \in \mathbb{R}$ . Řekneme, že  $M$  je:

- (i) **shora omezená**, jestliže  $\exists K \in \mathbb{R}$  pro  $\forall x \in M$  takové, že  $x \leq K$ .
- (ii) **zdola omezená**, jestliže  $\exists K \in \mathbb{R}$  pro  $\forall x \in M$  takové, že  $x \geq K$ .
- (iii) **omezená**, jestliže je omezená shora i zdola.

$K$  pak nazýváme **horní (dolní) závorou množiny  $M$** .

## Supremum

Nechť  $M$  je neprázdná a shora omezená podmnožina  $\mathbb{R}$ . Pak  $\exists! G \in \mathbb{R}$ , pro které platí:

- (i)  $\forall x \in M : x \leq G$  (horní závora)
  - (ii)  $\forall G' < G \exists x \in M : G' \leq x$  (nejmenší horní závora)
- (pro uzavřený interval  $G \in M$ , pro otevřený interval však **nikoliv**).

$$G = \sup M$$

## Infimum

Nechť  $M$  je neprázdná a zdola omezená podmnožina  $\mathbb{R}$ . Pak  $\exists! g \in \mathbb{R}$ , pro které platí:

- (i)  $\forall x \in M : x \geq g$  (dolní závora)
- (ii)  $\forall g' > g \exists x \in M : g' \geq x$  (nejmenší dolní závora)

$$g = \inf M$$

### DŮKAZ:

Definujme množinu  $-M := \{-x, x \in M\}$ . Pak  $-M$  je shora omezená (neboť  $M$  je zdola omezená). Tedy  $\exists G = \sup(-M)$  (supremum máme zavedeno axiomaticky).

$$G \geq -x \Rightarrow -G \leq x \Rightarrow g \leq x \quad \forall x \in M$$

Pak ovšem  $g := -G = \inf(M)$ .

### Příklady:

$(0, 2)$	$\inf M = 0 \notin M$	$\sup M = 2 \notin M$
$[0, 2]$	$\inf M = 0 \in M$	$\sup M = 2 \in M$
$\{n \in \mathbb{N} : x = 2 - 1/n\}$	$\inf M = 1 \in M$	$\sup M = 2 \notin M$
$(0, 2) \cup \{3\}$	$\inf M = 0 \notin M$	$\sup M = 3 \in M$

### VĚTA 2 (Archimédova vlastnost):

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : x < n$$

### DŮKAZ:

Sporem: předpokládejme, že  $\exists x \in \mathbb{R}$  takové, že pro  $\forall n \in \mathbb{N} : n \leq x$ . Pak je  $\mathbb{N}$  shora omezená, tedy  $\exists G = \sup \mathbb{N}$ .

Přitom pro  $\mathbb{N}$  platí:  $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$  (jde o průnik všech induktivních množin). Tedy  $n + 1 \leq G$  pro  $\forall n \in \mathbb{N}$ , tudíž  $n \leq G - 1$  pro  $\forall n \in \mathbb{N}$ . Ovšem v tom případě  $\sup \mathbb{N} = G - 1!$

‡ *Spor*

**Spočetnost:** Množina  $A$  je spočetná, existuje-li zobrazení  $f: \mathbb{N} \xrightarrow{1-1} A$ .

### VĚTA 3 (hustota racionálních a iracionálních čísel v reálných číslech):

$\mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{Q}$ : Kardinálně  $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$ , můžeme zobrazit všechna racionální čísla na  $\mathbb{N}$  (matice, řádky budou  $p$  a sloupce  $q$ , číslujeme diagonálně).

Pro každá  $a, b \in \mathbb{R}, a < b \exists q \in \mathbb{Q}, r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  takové, že  $a < q < b, a < r < b$  (ať uděláme sebeužší mezírku na reálné ose, vejde se nám tam nějaké racionální a iracionální číslo).

**DŮKAZ:**

Přímo:

( $\mathbb{Q}$ )  $q = m/n, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ .

Z Archimeda  $\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}$  takové, že  $1/(b-a) < n$ , tedy  $b-a > 1/n$ . Pak ale jistě existuje  $m \in \mathbb{Z}$  tak, že  $m/n \in (a, b)$ .

( $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ) Necht'  $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}, a < q_1 < q_2 < b$ .

Zvolme  $r = q_1 + 1/\sqrt{2}(q_2 - q_1)$ . Pak:

(i)  $r \in (q_1, q_2) \subset (a, b)$ , neboť  $1/\sqrt{2} < 1$ .

(ii)  $r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  (<cvičení>).

**VĚTA 4 (o existenci  $n$ -té odmocniny):**

(Tato věta je těžká!)

$$\forall x > 0, x \in \mathbb{R} \wedge \forall n \in \mathbb{N} : \exists y > 0, y \in \mathbb{R}, \quad y^n = x$$

**DŮKAZ:**

Nejdříve si označme:

$$R_0^+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$$

$$R^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

Definujme si nějaké pomocné množiny:

$$M_1 := \{k > 0, k \in \mathbb{R} : k^n \leq x\}$$

$$M_2 := \{k > 0, k \in \mathbb{R} : k^n \geq x\}$$

**LEMMA 1:**

$$R^+ = M_1 \cup M_2$$

**DŮKAZ:**

Zřejmě  $M_1 \subseteq \mathbb{R}^+, M_2 \subseteq \mathbb{R}^+ \Rightarrow M_1 \cup M_2 \subseteq \mathbb{R}^+$ .

Kdyby  $\mathbb{R}^+ \neq (M_1 \cup M_2)$ , pak  $\exists k, k \notin (M_1 \cup M_2)$ , tedy  $k^n \not\leq x$  ani  $k^n \not\geq x$ , což je ve sporu s dichotomií.

✘ *Spor*

Nyní si definujme  $y_1 = \sup M_1, y_2 = \inf M_2$ .

**LEMMA 2:**

$$y_1^n \leq x \wedge x \leq y_2^n$$

**DŮKAZ:**

Dokažme  $y_1^n \leq x$  sporem:  $y_1^n > x$ .

Pak by dle Archimeda  $\exists h > 0, h > \frac{ny_1^n}{y_1^n - x}$  (trik). Tedy:

$$k \in M_1 \Rightarrow k^n \leq x \Rightarrow -x \leq -k^n$$

$$y_1^n - x \leq y_1^n - k^n$$

Z binomické věty:

$$y_1^n - k^n = (y_1 - k) \underbrace{(y_1^{n-1} + y_1^{n-2}k + \dots + y_1k^{n-2} + k^{n-1})}_{n \text{ členů, všechny } \leq y_1^{n-1}} \leq (y_1 - k)ny_1^{n-1}$$

Z (ii) vl. suprema  $\exists k \in M_1 : k > y_1 - 1/h$ , tedy:

$$(y_1 - k)ny_1^{n-1} < \frac{ny_1^{n-1}}{h} < ny_1^{n-1} \frac{y_1^n - x}{ny_1^{n-1}} = y_1^n - x$$

$$y_1^n - x < y_1^n - x$$

✗ *Spor*

Analogicky  $x \leq y_2^n$ .

Nyní konečně můžeme dokázat  $y_1 = y_2$ . Víme, že nejde, aby  $y_2 < y_1$  (jinak  $y_1^n > y_2^n$ ), tedy stačí vyloučit  $y_1 < y_2$ . Kdyby to ovšem platilo, dle V.3- by  $\exists q \in \mathbb{Q}, q \in (y_1, y_2)$ , což je však spor s  $\mathbb{R}^+ = M_1 \cup M_2$ .

*Q.E.D.*